

## LA COQUETTE

( *LABRUS BIMACULATUS* )



*Dominique Resse*



*D. Resse*



*Jean-Luc Lemaire*

### CARACTERISTIQUES :

**Famille :** Labridés (vielles, crénilabres, girelles....)

**Synonymes :** Labre mêlé, labre varié.

**Distribution :** De la Norvège au Sénégal, Méditerranée.

**Habitat :** sur les fonds rocheux et les herbiers de 1 à 200m maxi. Nous pouvons rencontrer de beaux spécimens sur les épaves (comme ces photos présentent par Dominique au large de St. Valéry). L'hiver, les coquettes adultes se replient plus au large. Les juvéniles vivent plutôt dans les 10 premiers mètres.

**Nourriture :** Crustacés, mollusques, petits poissons.

**Taille :** Les femelles mesurent jusqu'à 26cm alors que les mâles dominants (plus vieux) atteignent 35cm (40cm maxi et 1kg).

**Comportement :** C'est un poisson plutôt timide et pas très fréquent. Les mâles dominants aux superbes livrées se laisseront tout de même approcher.

**Importance économique :** Sans valeur pour la pêche. Sa coloration pourrait en faire un poisson d'aquarium mais sa grande agressivité ne facilite pas l'élevage.



*Dominique Resse*

Dichronisme sexuel : la femelle est beaucoup plus sobre.

D. Resse




## CROISSANCE et REPRODUCTION :

La maturité sexuelle arrive à 2 ans (la femelle atteint 16cm). Le frai se déroule au début de l'été. Durant cette période, Les couleurs de la robe se ravivent et une tache blanche apparaît sur le front du mâle. Il creuse à l'aide de sa queue un creux dans le sable et y attire la femelle. Il aura pris soin de chasser tout les mâles concurrents des alentours. Si madame est séduite, elle y déposera un amas d'œufs visqueux que le mâle fécondera et gardera jalousement jusqu'à l'éclosion (qui intervient très rapidement). Les larves, à peine formées continuent leur développement en pleine eau en vivant sur leur sac vitellin. Au

bout d'un mois d'existence pélagique où les larves seront devenues autonomes, elles se pigmentent et gagnent les fonds du littoral.

Adultes, arrivées à un certain âge, quelques femelles pourront se transformer en mâles dominants. Les coquettes pourraient vivre 17 à 20 ans.



Dominique Resse



Jean-Luc Lemaire

## DESCRIPTION :

En dehors de leur robe chatoyante, les coquettes se distinguent par leur tête allongée et leur grande bouche puissamment endentée. La nageoire dorsale sur laquelle se prolongent les couleurs des flancs commence en rayons épineux pour terminer en rayons souples. Les mâles adultes ont la tête verte marbrée de turquoise, ces motifs continus le long de la ligne latérale jusqu'à la queue. L'arrière du dos et le bas du flanc sont jaune orangé. Un liseré bleu couronne la nageoire anale. La queue se termine par un joli bleu cobalt. La femelle est plus sobre avec sa robe orangée, 3 taches noires encadrées de blanc sur le haut du dos en amont de la caudale. Elle est toujours de taille plus modeste que le mâle.



D. Resse

Mâle juvénile non dominant ou femelle en cours de changement de sexe ? →



Jean-Luc Lemaire



Jean-Luc Lemaire



Dominique Resse