



LA DORADE GRISE

(*Spondyliosoma cantharus*)



CARACTERISTIQUES :

Famille : Sparidés (sars, denti, saupe, sparillon, oblade)

Nourriture : Elle est omnivore et consomme des petits crustacés, vers, mollusques, œufs de poissons, algues...

Distribution : Manche, mer du Nord, Scandinavie, îles Britanniques, Baltique, Islande, Méditerranée.

Habitat : on trouve ce pélagique en été près du fond à partir de la zone de marée basse jusqu' 60m. Préférence pour les fonds rocheux et les herbiers, mais aussi sur nos épaves qui lui procurent de nombreux abris. L'hiver, elles se regroupent et descendent au large. (100m. maximum).

Synonymes : Griset, brème de mer, dorade commune, mange-goémons, galet, canthare...

Taille : De 20 à 30 cm. (maxi 50cm. et 2kg.)

Importance économique : Bien qu'elle ait moins grande réputation que ses cousines royales et roses, sa chair vaut celle du bar. Une taille légale de capture est fixée à 23cm. en Manche mais pas en Méditerranée. Mise à part le chalutage de nuit au large du Cotentin sur les bancs hivernaux, les prises occasionnelles le restant de l'année ne sont jamais assez abondantes pour représenter une réelle importance économique.

Comportement : Espèce assez farouche



CROISSANCE et REPRODUCTION :

La dorade grise est hermaphrodite et commence sa vie en tant que femelle (maturité sexuelle à 2 ans avec une taille d'environ 20cm.). Elle deviendra mâle dans sa huitième année (35cm.). La longévité est de 20 ans (50 cm) si elle a réussi à échapper aux filets. La période de reproduction en Manche s'étale d'avril à l'Ouest jusqu'en septembre en baie de Seine. Au printemps donc, les dorades reviennent vers la zone côtière. Les bancs formés au large pour l'hiver se désagrègent et les mâles creusent dans le gravier au milieu des algues une cuvette à coups de queue. Le femelle viendra y pondre ses œufs et le mâle gardera plusieurs semaines le nid, aèrera la ponte et surveillera les alevins jusqu'à leur départ définitif. Les juvéniles resteront 2 à 3 ans le long de la bande côtière. Les adultes se reconstituent en bancs à l'automne pour migrer vers les zones profondes de la Manche Ouest.



De jeunes individus ont 4 lignes dorées sous la ligne latérale

DESCRIPTION :

La dorade grise est de forme ovale. Le corps est comprimé latéralement et symétrique, c'est-à-dire que le dos est aussi bombé que le ventre. La coloration générale est le gris-argenté avec une tache plus sombre sur le front. En période de reproduction, elles présentent une livrée différente pour les populations de l'Atlantique et pour celles de la Méditerranée. En Atlantique, les mâles sont très foncés, avec une ou plusieurs barres claires verticales sur les flancs. En Méditerranée, ils sont bleutés, avec de fines lignes longitudinales bleues et quelques larges bandes verticales foncées partant de la nageoire dorsale et s'estompant en descendant vers le ventre. La ligne latérale est bien marquée. Chez les jeunes individus, les pointes de la nageoire caudale sont blanches et le museau est plus pointu. Les mâles ont le front légèrement concave. La nageoire dorsale est constituée dans sa première moitié de rayons épineux puis se termine en rayons souples. Les nageoires pectorales sont assez développées.



Beau male en vadrouille

