

LE GRONDIN PERLON

(*TRIGLA LUCERNA*)



CARACTERISTIQUES :

Famille : Triglidés.

Taille : De 30 à 60cm pesant de 500 gr à 1,5kg. (75cm maxi et jusqu'à 6kg).

Habitat : fonds meubles de 10 à 150m. (fréquente surtout la zone des 20m).

Distribution : De la Norvège au Maroc, Méditerranée.

Nourriture : poissons, petits crustacés.

Synonymes : Mouline, papillon de mer en Manche, gallinette en Atlantique, on appelle communément le perlon le rouget grondin ou grondin hirondelle.

Comportement : En général solitaire, il peut vivre aussi en compagnie de quelques congénères. Soit il marche, soit il déploie ses pectorales pour faire des petits bonds en planant au-dessus du fond. Les grondins peuvent émettre des grognements en contactant leurs muscles autour de la vessie natatoire très développée (d'où leur nom)



Dominique Resse

Le grondin camard (comme le perlon) est reconnaissable à ses belles nageoires pectorales bordées de bleu

DESCRIPTION :

Les perlons sont les plus gros représentants des grondins. Ces poissons ont un corps élancé effilé vers l'arrière. Leur grosse tête biseauté est cuirassée par des plaques osseuses se terminant par des épines sur le bord des opercules. L'œil assez gros cerclé de jaune peut être aussi surmonté d'une petite épine. Comme tous les grondins, ils ont 2 dorsales et une caudale triangulaire puissante mais se qui les caractérisent surtout, ce sont leurs nageoires pectorales dont les trois premiers rayons libres sont mobiles. Ils s'en servent pour se déplacer sur le fond et détecter les petits crustacés enfouis dans le sable (l'extrémité de ces rayons est en effet dotée des nombreux organes gustatifs et olfactifs). La couleur verte des pectorales déployées du perlon sont souvent vives avec un liseré bleu irisé. Le ventre est clair mais la coloration des flancs peut être très variable, brun rougeâtre pâle à rouge vif avec des marbrures claires. Sa longévité est d'environ 7 ans.



Dominique Resse

Grondin camard à la face très verticale



Grondin perlon sur le fond

COISSANCE et REPRODUCTION :

à août (concentration en mai-juin). Il semblerait que les bancs de reproducteurs comptent une plus grande proportion de femelles. La ponte qui va jusqu'à 150 000 œufs est fractionnée sur une longue période. Les œufs sont pélagiques et au bout de 5 jours éclosent les alevins de 3mm qui s'adapteront au bout de plusieurs semaines à une vie sur le fond. Le grondin fait environ 10cm en fin de 1ere année.

Reconnaitre les GRONDINS

On trouve principalement six espèces de grondins en Manche. Le grondin rouge est de loin le plus abondant.



Grondin lyre: (*Trigla lyra*) Possède en arrière de l'opercule des piquants très développés et 2 excroissances en bout du museau faisant repenser à une sorte de lyre. Sa coloration va de l'orange au rouge avec un ventre clair. Il vit plus profondément que les autres grondins (jusqu'à 400m) des côtes méridionales anglaises à la Méditerranée. Sa maturité sexuelle arrive à 28-30cm. Il peut atteindre jusqu'à 60cm de long.



Grondin perlon: (*trigla lucerna*) C'est le plus grand des grondins (jusqu'à 75cm). Le dos brun marbré quand il est jeune devient brun rouge une fois adulte avec les flancs orangés et le ventre clair. Il est surtout reconnaissable à ses nageoires pectorales vivement colorées de vert bordées d'un liséré bleu. Sa tête massive présente 2 rostrés arrondies en bout du museau. Il est présent à partir de 20m sur le plateau continental européen et méditerranéen. Une grosse partie des prises est faite en Espagne.



Grondin Morrude: (*Chelidoichthys obscurus*) Dos et flancs beiges à rougeâtres avec quelques marques brunes, Les nageoires pectorales vont du jaune au vert et peuvent être bordées de bleu vif. Il se distingue surtout par un 2eme rayon de dorsale très longue. Il vit sur des fonds meubles de 20 à 70m. On le trouve en Méditerranée et Atlantique du Maroc à la Norvège mais il n'est présent qu'en Manche Ouest. Sa biologie reste peu connue et il n'a pas d'importance économique. Il mesure de 25 à 30cm (40cm maxi).

Grondin gris: (*Eutrigla gurnardus*) Dos rose-brun à gris-vert parsemé de tâches blanches (comme les 2 variantes ci-contre). Le ventre est blanc nacré. Ses écailles épineuses lui donnent un aspect rugueux. La ligne latérale claire est bien marquée et pourvue d'excroissances osseuses. La nageoire pectorale est courte et on le reconnaîtra à la tâche noire sur l'arrière de sa 1ere dorsale. Il se rapproche des côtes au printemps pour la reproduction (à partir de 3 ans et 18cm pour le mâle et 4 ans et 24cm pour la femelle). Il regagne les profondeurs en automne. Présent du cercle polaire au Maroc et en Méditerranée. De 25 à 45cm et 1kg maxi.



Grondin rouge: (*Aspitrigla cuculus*) Dos et flancs rouges assez vif avec des marbrures claires, ventre blanc. Les pectorales qui peuvent tirer sur le jaune dans la partie inférieure sont assez courtes par rapport aux autres grondins. Les écailles en chevron sont bien visibles sur la ligne latérale. La 2e épine de la première dorsale est plus longue. Son museau est échancré. Il vit sur fonds de sable, gravier ou roches de 20 à 200m. Le grondin rouge mesure en moyenne 40cm (50 maxi). On le trouve sur la façade Atlantique de la Norvège à la Mauritanie ainsi qu'en Méditerranée. Il est essentiellement pêché au chalut en Manche, c'est le plus commun dans nos poissonnerie.



Grondin camard: (*trigla lastoviza*) Ce grondin au dos et aux flancs brunâtres à rougeâtres se caractérise surtout par une tête haute et un museau presque droit. Quelques marbrures plus sombres plus ou moins contrastées le parcourent, il est aussi parsemé petites tâches rouges. Ses pectorales amples et longues sont ornées d'un beau rouge vif. On le trouve sur fonds meubles de 20 à 100m de la Mauritanie et en Méditerranée jusqu'en Manche. Sa taille va de de 25 à 35cm.

