

LE ROUGET DE ROCHE

(MULLUS SURMULETUS)



CARACTERISTIQUES :

Famille : Mullidés (poisson de fond, tête à front arqué possédant des barbillons)

Synonymes : Surmulet.

Nourriture : vers, mollusques, petits crustacés et alevins de certains autres poissons.

Distribution : Façade Atlantique, de la mer du Nord au Maroc, Méditerranée.

Habitat : Le rouget de roche vit en petites bandes sur les fonds sableux, vaseux ou les herbiers de 3 à 100m. Il est commun de rencontrer de jeunes individus de 12 à 15cm. encore immatures aux abords du littoral avant qu'ils ne s'éloignent vers le large. On observe plus souvent le rouget de roche en plongée que le rouget de vase. Ce dernier vit plus profond en Méditerranée et sans doute moins répandu en Manche.

Taille : 25 à 35cm (400 à 800gr). De rares individus peuvent vivre jusqu'à 11 ans et atteindre 50cm et 1,5 kg.

Importance économique : Les gros rougets deviennent rares. Une évolution de la taille des mailles des filets serait peut être nécessaire pour préserver l'espèce. Il se pêche (15cm. mini) après la reproduction d'octobre à avril (dès aout à Granville).

Comportement : En plongée, si le fond est un peu vaseux, vous n'aurez aucun mal à repérer une petite bande de rougets par le nuage de particules qu'ils soulèvent dans leur quête de nourriture. Ils sont plus farouches que le rouget de vase, leur état d'alerte se remarquera par leur dorsale redressée.



CROISSANCE et REPRODUCTION :

Le rouget de roche (ou surmulet) atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 2 ans. Il mesurera alors presque 16cm. Au printemps, il remonte jusqu'aux cotes de la Manche ou il fraie de juillet à septembre. La femelle pond suivant sa taille de 4 000 à 90 000 œufs en plusieurs fois.

A l'éclosion, les juvéniles ressembleront à de micro-sardines avec un dos bleu et des flancs argentés, Ils resteront proche de la cote sur des fonds de 2 à 10m. A une taille de 5cm , ils prennent progressivement la livrée d'adulte et commencent à descendre vers le large.

DESCRIPTION :

Durant la journée, le rouget de roche a une coloration brun rouge avec plusieurs bandes longitudinales jaunes (motif que n'a pas le rouget de vase). La nuit, ses flancs prennent une allure marbrée.

Il a une tête massive oblique avec un front légèrement plus bombé que son cousin de vase mais les 2 restent d'allure très semblable.

La première nageoire dorsale est colorée avec une bande jaune ou rouge dans sa partie supérieure (elle est incolore chez le rouget de vase)



Voyez la variété de couleur des rougets donc fiez vous à la coloration (ou pas) de sa dorsale pour l'identifier

